

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

13 ИЮЛ 2022

ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению лекарственного препарата
Чистотел Максимум ошейник (Chistotel Maximum collar)

(Организация-разработчик: АО «НПФ «Экопром»; 140070, Московская обл.,
г. Люберцы, раб. пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 11/23, пом. 263)

Номер регистрационного удостоверения: 32-3-1.17-3554 № ПВР-3-3.8/02129

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Чистотел Максимум ошейник.

Международные непатентованные наименования действующих веществ: фипронил, перметрин.

2. Лекарственная форма: полимерная лента.

Чистотел Максимум ошейник содержит в качестве действующих веществ фипронил - 5%, перметрин - 1% и вспомогательные вещества: ПВХ-С-70-59-М, ди-(2-этилгексил)-фталат (ДОФ), мел, масло эпоксидированное соевое, краситель фиолетовый или черный или красный, диоксид титана, стеарат кальция, ТОСС, эфирное масло лаванды, ромашки масляный экстракт, чистотела масляный экстракт.

3. По внешнему виду препарат представляет собой полимерную ленту фиолетового, или красного, или черного цвета с фиксатором.

Срок годности ошейника при соблюдении условий хранения – 3 года со дня производства. Запрещается применение препарата по истечении срока годности.

4. Чистотел Максимум ошейник выпускают для собак длиной 65 см; для кошек длиной 40 см; для щенков и котят длиной 50 см в индивидуальных герметично закрытых пакетах из материала комбинированного на основе алюминиевой фольги, помещенных поштучно в картонные пачки вместе с инструкцией по применению. Чистотел Максимум ошейник объединенной модификации для собак и для кошек длиной 65 см выпускают в индивидуальных герметично закрытых пакетах из материала комбинированного на основе алюминиевой фольги. Помещают по 3 ошейника в картонные пачки вместе с инструкцией по применению.

5. Хранят ошейник в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 0°C до 30°C.

6. Ошейник следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Чистотел Максимум ошейник относится к комбинированным инсектоакарицидным лекарственным препаратам.

10. Фипронил и перметрин, входящие в состав ошейника, выделяясь с поверхности ленты, практически не всасываясь, переносятся на кожно-волосяной покров животного и оказывают контактное инсектоакарицидное действие на половозрелые фазы развития блох, вшей, власоедов и иксодовых клещей, паразитирующих на собаках и кошках.

Фипронил относится к группе фенилпиразолов, отличающихся высокой длительной инсектицидной токсичностью. Механизм действия фипронила заключается в нарушении прохождения ионов хлора в ГАМК-зависимых рецепторах эктопаразита, нарушении передачи нервных импульсов и деятельности нервной системы, что приводит к параличу и гибели членистоногих.

Перметрин относится к группе пиретринов (пиретроидов). Механизм действия перметрина заключается в блокировании передачи нервных импульсов, что вызывает нарушение координации движений, паралич и гибель эктопаразитов.

Чистотел Максимум ошейник хорошо переносится животными, не обладает местно-раздражающим и кожно-резорбтивным действием.

III. Порядок применения

11. Чистотел Максимум ошейник применяют для уничтожения блох, вшей, власоедов и иксодовых клещей, паразитирующих на собаках и кошках, щенках и котятах старше 4-месячного возраста, а также для защиты животных от их нападения, особенно в теплое время года (в период повышенной активности паразитов).

12. Чистотел Максимум ошейник запрещается применять больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным.

13. При работе с Чистотел Максимум ошейником следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Животное с Чистотел Максимум ошейником не следует подпускать к маленьким детям. При случайном контакте ошейника с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Чистотел Максимум ошейником. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку). Пустые пачки из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

14. Чистотел Максимум ошейник запрещается применять кормящим и беременным самкам, щенкам и котятам моложе 4-месячного возраста.

15. После вскрытия упаковки ошейник разворачивают и надевают на животное, подгоняя по размеру так, чтобы между шеей животного и ошейником оставался промежуток в 1,0 - 1,5 см, затем закрепляют фиксатором и излишек ленты срезают.

Постоянное ношение Чистотел Максимум ошейника обеспечивает защиту собак и кошек от иксодовых клещей на протяжении 3 месяцев, от насекомых - на протяжении 4 месяцев.

Для достижения максимального эффекта рекомендуется надеть ошейник на животное за 2-3 дня до предполагаемого контакта с паразитами.

При сильной степени заражения животного насекомыми перед применением Чистотел Максимум ошейника животное целесообразно вымыть инсектицидным шампунем, а подстилки обработать инсектицидным средством в соответствии с инструкциями по применению.

16. Побочных явлений и осложнений при применении Чистотел Максимум ошейника в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата, возможны избыточная саливация, слезотечение, признаки раздражения кожи, в этих случаях ошейник снимают, животное моют с мылом и ополаскивают шерсть большим количеством проточной воды, а при необходимости назначают антигистаминные и симптоматические средства.

17. Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата не выявлены.

18. Не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидными препаратами.

19. Особеностей действия в начале ношения ошейника и при его снятии не установлено.

20. Следует избегать нарушений режима применения ошейника, так как это может привести к снижению эффективности.

21. Препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименование и адрес производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения

АО «Научно-производственная фирма «Экопром»; Московская обл., г. Люберцы, рабочий поселок Томилино, ул. Гаршина, 11/23.

Наименование и адрес организации, уполномоченной владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя

АО «Научно-производственная фирма «Экопром»; Московская обл., г. Люберцы, рабочий поселок Томилино, ул. Гаршина, 11/23, пом. 263.

Генеральный директор
АО «НПФ «Экопром»

Е.М. Киселев

