

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

27 ОКТ 2021

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата
ЭМИЦИДИН[®] 2,5% раствор для инъекций

(Организация-разработчик: ООО «НВЦ Агроветзащита»,
Россия, 129329, г.Москва, Игарский проезд, д. 4, стр.2)

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-30.12-3858№ПВР-3-4.5/01633

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:
торговое наименование: ЭМИЦИДИН[®] 2,5% раствор для инъекций (EMUCIDIN[®]
2,5% for injection);

международное непатентованное или группировочное наименование:
этилметилгидроксипиридина сукцинат.

2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.

ЭМИЦИДИН[®] 2,5% раствор для инъекций в качестве действующего вещества
содержит этилметилгидроксипиридина сукцинат - 25 мг/мл и вспомогательное ве-
щество - воду для инъекций.

3. По внешнему виду препарат представляет собой бесцветную или светло-
желтого цвета прозрачную жидкость.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в
закрытой упаковке производителя – 3 года со дня производства, после первого
вскрытия флакона – 28 суток, вскрытая ампула хранению не подлежит. Запрещается
применение лекарственного препарата по истечении срока годности.

4. Выпускают лекарственный препарат расфасованным по 2 мл и 5 мл в ам-
пулы из нейтрального стекла, упакованные по 5 или 10 штук в контурную
ячейковую упаковку; по 10 мл, 50 мл и 100 мл во флаконы из темного нейтрального
стекла укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми
колпачками с контролем первого вскрытия. Контурные ячейковые упаковки и фла-
коны с лекарственным препаратом помещают поштучно в картонные пачки.

Каждая потребительская упаковка снабжается инструкцией по применению
лекарственного препарата.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, в за-
щищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 2 °С до 25 °С.

6. ЭМИЦИДИН® 2,5% раствор для инъекций следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. ЭМИЦИДИН® 2,5% раствор для инъекций относится к лекарственным средствам фармакотерапевтической группы антиоксиданты и антигипоксанты.

10. Этилметилгидроксипиридина сукцинат, входящий в состав препарата, является ингибитором свободно-радикальных процессов в организме, обладает выраженными антиоксидантными, антигипоксическими, ноотропными и мембранопротекторными свойствами, повышает устойчивость организма к воздействию свободных радикалов, оказывает лечебное и профилактическое действие при кислородозависимых патологических состояниях организма (шок, гипоксия, ишемия), улучшает синаптическую передачу и транспорт медиаторов.

Механизм действия заключается в способности препарата уменьшать процессы перекисного окисления липидов в мембранах клеток, снижать содержание общего холестерина и липопротеидов низкой плотности, связывать свободные радикалы, активизировать энергосинтезирующую функцию митохондрий и повышать устойчивость организма к кислородной недостаточности.

После парентерального применения препарат быстро распределяется в органах и тканях животного. Выводится из организма в основном с мочой в виде метаболитов и в незначительном количестве в неизмененном виде.

ЭМИЦИДИН® 2,5% раствор для инъекций по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), не обладает местно-раздражающими, кумулятивными, эмбриотоксическими и тератогенными свойствами.

III. Порядок применения

11. ЭМИЦИДИН® 2,5% раствор для инъекций назначают собакам и кошкам с лечебной и профилактической целью самостоятельно и в комплексной терапии:

- в восстановительный период после перенесенных заболеваний;
- при острой и хронической сердечно-сосудистой и легочной недостаточности;
- в посттравматический и послеоперационный периоды с целью профилактики наркотических и постнаркотических осложнений и острой интоксикации антипсихотическими (нейролептическими) лекарственными средствами;
- при черепно-мозговых травмах и нарушениях мозгового кровообращения;
- при патологических состояниях, сопровождающихся гипоксией (кислородной недостаточностью) органов и тканей;
- в ветеринарной гериатрии при возрастных нарушениях функций организма;

- при патологии кожных покровов (раны, дерматиты, трофические язвы, ожоги, обморожения), а также с целью улучшения состояния кожно-волосяного покрова;

12. Противопоказанием к применению является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам лекарственного препарата.

13. При работе с лекарственным препаратом ЭМИЦИДИН® 2,5% раствор для инъекций следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. При случайном контакте препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо немедленно промыть большим количеством проточной воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом ЭМИЦИДИН® 2,5% раствор для инъекций. В случае появления аллергических реакций и/или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку). Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

14. Применение лекарственного препарата беременным и кормящим животным, щенкам и котятм до 2-х месячного возраста, при необходимости, проводят под наблюдением ветеринарного врача.

15. ЭМИЦИДИН® 2,5% раствор для инъекций вводят подкожно, внутримышечно или внутривенно (капельно, со скоростью 60 капель в минуту) в дозе 1,0 - 4,0 мл препарата на 10 кг массы животного (2,5 – 10 мг/кг массы животного по действующему веществу) один или два раза в сутки в течение 5-15 дней.

В ветеринарной гериатрии ЭМИЦИДИН® 2,5% раствор для инъекций применяют собакам и кошкам старше 7 лет в весенний и осенний периоды один раз в сутки в течение 10-30 дней в дозе 1,0 мл на 10 кг массы животного (2,5 мг/кг массы животного по действующему веществу). При внутривенном способе введения лекарственный препарат разводят стерильным физиологическим раствором или водой для инъекций в соотношении 1:1 об/об.

Дозу, продолжительность курса и кратность применения препарата назначает лечащий ветеринарный врач в зависимости от физиологического состояния животного и течения болезни.

16. При применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается.

При повышенной индивидуальной чувствительности животного и появлении аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

17. Симптомы передозировки у животных не выявлены.

18. Информация о несовместимости препарата ЭМИЦИДИН® 2,5% раствор для инъекций с лекарственными препаратами других фармакологических групп и кормовыми добавками отсутствует.

19. Особенностей действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

20. Следует избегать нарушений рекомендуемой схемы применения лекарственного препарата во избежание снижения его эффективности. В случае пропуска введения одной или нескольких доз препарата курс применения необходимо возобновить в той же дозе и по той же схеме.

21. Лекарственный препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименование и адреса производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения:

1. ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1.

2. ООО «ДЕКО-ФАРМ», Россия, 171130, Тверская обл., Вышневолоцкий р-н, пос. Зеленогорский, ул. Советская, д. ба.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1.