

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Фиприста® Спот Он
для борьбы с эктопаразитами собак и кошек

(организация-разработчик АО «КРКА, д.д., Ново место»/ «KRKA, d.d., Novo mesto»,
Šmarješka cesta 6, 8501, Novo mesto, Slovenija)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Фиприст® Спот Он (Fipryst Spot On).
Международное непатентованное наименование: фипронил.

2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

Фиприст Спот Он в качестве действующего вещества содержит фипронил – 100 мг в 1 мл, а в качестве вспомогательных веществ - повидон, полисорбат, бутилгидроксанизол, бутилгидротолуен и диметилсульфоксид.

3. По внешнему виду Фиприст® Спот Он представляет собой прозрачный раствор желтоватого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 3 года с даты производства.

Запрещается использовать лекарственный препарат по истечении срока годности.

4. Выпускают Фиприст® Спот Он расфасованным по 0,5; 0,67; 1,34; 2,68; 4,02 мл в полиэтиленовые пипетки, помещенные поштучно в пакеты из алюминиевой фольги. Пипетки упаковывают в картонные пачки по три штуки вместе с инструкцией по применению.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, отдельно от пищевых продуктов и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 0°С до 25°С.

6. Фиприст® спот Он следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства. При уничтожении неиспользованного препарата не следует допускать его попадания в природные водоемы и источники питьевой воды.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства.

9. Фиприст® Спот Он – инсектоакарицидный лекарственный препарат контактного действия.

10. Препарат активен в отношении всех фаз развития вшей, блох, власоедов и клещей (иксодовые, хейлтеллы, отодектосы), паразитирующих на собаках и кошках.

Механизм действия фипронила, входящего в состав препарата, заключается в блокировании ГАМК-зависимых рецепторов членистоногих, нарушении передачи нервных импульсов, что приводит к параличу и гибели эктопаразитов.

После нанесения препарата на кожу фипронил в течение 24 часов постепенно распределяется по всей поверхности тела и, практически не всасываясь в системный кровоток, накапливается в эпидермисе, волосяных луковицах и сальных железах, оказывая длительное контактное инсектоакарицидное действие, обеспечивает защиту животного от эктопаразитов.

Фиприст® Спот Он по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает кож-

но-раздражающего и резорбтивно-токсического действия, при попадании в глаза вызывает слабое раздражение. Препарат токсичен для кроликов, а также рыб и других гидробионтов.

III. Порядок применения

11. Фиприст® Спот Он назначают собакам и кошкам с 8-недельного возраста при энтомозах, отодектозе, поражении клещами (иксодовыми, хейлителлами), а также в комплексной терапии аллергического дерматита, вызываемого блохами.

12. Противопоказанием к применению является повышенная индивидуальная чувствительность животного к ингредиентам препарата (в том числе в анамнезе). Запрещается применение Фиприста® Спот Он больным инфекционными болезнями и ослабленным животным, собакам массой менее 2 кг.

Не допускается аурикулярное применение препарата (при ушной чесотке) при прободении барабанной перепонки.

13. Фиприст® Спот Он применяют животным путем однократного топикального нанесения на сухую неповрежденную кожу, используя пипетки различной фасовки (в зависимости от вида и массы животного).

Перед обработкой кончик пипетки прокалывают перевернутым колпачком, раздвигают у животного шерсть в области спины (между лопатками) и, нажимая на пипетку, наносят препарат на кожу в одну или несколько точек в следующих дозах:

Вид животного, масса (кг)	Объем используемой пипетки (мл)/содержание фипронила (мг)	Количество пипеток
Собаки:		
2-10	0,67/67	1
10-20	1,34/134	1
20-40	2,68/268	1
более 40	4,02/402	1
Кошки	0,5/50	1

Продолжительность защитного действия препарата против иксодовых клещей после обработки кошек составляет 15-21 день, после обработки собак – до 1 месяца; продолжительность защитного действия против блох после обработки кошек – до 1,5 месяца, после обработки собак – 2-2,5 месяца.

Повторные обработки животных проводят по показаниям, но не чаще одного раза в три недели.

В целях предотвращения повторной инфекации животных блохами подстилки заменяют или обрабатывают инсектицидным средством в соответствии с инструкцией по его применению.

Для лечения отодектоза Фиприст® Спот Он закапывают в каждое ухо по 4-6 капель (капли обязательно вводят в оба уха). Для равномерного распределения препарата ушную раковину складывают пополам и слегка массируют ее основание. Остаток препарата в используемой пипетке (в расчете на массу животного), наносят на кожу между лопаток (однократная обработка).

При осложнении отодектоза отитом назначают противомикробные и противовоспалительные средства.

Не следует мыть и купать животное в природных водоемах в течение 48 часов после обработки, а также наносить препарат на влажную или поврежденную кожу.

14. При значительной передозировке у животного может наблюдаться избыточное слюноотделение, мышечная дрожь, рвота. В этом случае препарат смывают водой с моющим средством и применяют общие меры, направленные на его выведение из организма.

15. Особенностей действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

16. Препарат разрешается применять животным, предназначенным для разведения, а также беременным и лактирующим самкам. Запрещается применение Фиприста® Спот Он щенкам и котятм моложе 8-недельного возраста.

17. Следует избегать нарушений схемы применения препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска очередной обработки ее следует провести как можно скорее в той же дозе.

18. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности и появлении аллергических реакций, препарат следует смыть водой с мылом или зоошампунем и при необходимости провести десенсибилизирующую терапию.

19. Фиприст® Спот Он не следует применять совместно с другими инсектоакарицидными средствами для обработки животных.

20. Фиприст® Спот Он не предназначен для обработки продуктивных животных.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с Фипристом® Спот Он следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Во время работы не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством. В течение 24 часов после обработки животное не следует гладить и подпускать к маленьким детям.

22. Не следует допускать к работе с препаратом лиц с признаками аллергических, респираторных и кожных заболеваний. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата необходимо избегать прямого контакта с Фипристом® Спот Он.

23. При случайном попадании препарата на кожу или слизистые оболочки его следует тотчас снять тампоном и затем смыть водой с моющим средством; при попадании внутрь – дать выпить несколько стаканов теплой воды, энтеросорбент и при необходимости обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь этикетку или инструкцию по применению).

Наименования и адреса производственных площадок производителя препарата

«KRKA, d.d., Novo mesto», Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija;
«KRKA, d.d., Novo mesto», Povhova ulica 5, 8501 Novo mesto, Slovenija.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

Представительство АО «КРКА, д.д., Ново место» в РФ,
125212, г. Москва, Головинское шоссе, дом 5, корпус 1
Тел.: (495) 981-10-95, факс: (495) 981-10-91.

Номер регистрационного удостоверения 705-3-14.15-3012 N.17B4-3-8.0/0322-2

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Фиприста Спот Он, утвержденная Россельхознадзором 03 ноября 2010 г