

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по применению БлохНэт®max для борьбы с эктопаразитами  
собак и кошек

(организация- разработчик ООО «НВП «Астрафарм», г. Москва)

**I. Общие сведения**

1. Торговое наименование лекарственного препарата: БлохНэт®max (BlochNet max).

Международное непатентованное (химическое) наименование: фипронил, бензилбензоат, диэтилтолуамид, изопропиловый эфир 11-метокси-3,7,11-триметил-2,4-транс-додекадиеновой кислоты.

2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

БлохНэт®max в 1 мл в качестве действующих веществ содержит фипронил – 50 мг, бензилбензоат – 50 мг, диэтилтолуамид – 60 мг, ювемон (изопропиловый эфир 11-метокси-3,7,11-триметил-2,4-транс-додекадиеновой кислоты) – 1 мг и вспомогательные вещества: глицерин – 190 мг, диметилсульфоксид – 56 мг, отдушку «Арбуз» – 2,95 мг, бензиловый спирт – 105 мг и изопропиловый спирт – до 1 мл. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную маслянистую жидкость желтого цвета.

3. Выпускают БлохНэт®max расфасованным по 1, 2, 3 и 4 мл в полимерные флаконы-капельницы или стеклянные флаконы, снабженные пробками-капельницами. Флаконы укупоривают навинчиваемыми пластмассовыми крышками с контролем первого вскрытия и помещают поштучно в картонные коробки. Возможна дополнительная упаковка флакона в блистерную упаковку.

4. Хранят БлохНэт®max в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, вдали от нагревательных приборов и источников огня, при температуре от 0°C до 25°C. Во время транспортировки допускается кратковременное замораживание лекарственного препарата, что не снижает его активности после оттаивания.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 2 года с даты производства.

БлохНэт®max запрещается применять по истечении срока годности.

5. БлохНэт®max следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства

## II. Фармакологические свойства

7. БлохНэт® тах относится к группе комбинированных инсектоакарицидных лекарственных препаратов. Обладает выраженным инсектоакарицидным действием против всех фаз развития блох, вшей, власоедов, личинок и имаго иксодовых и саркоптоидных клещей, паразитирующих на собаках и кошках, а также репеллентным действием против кровососущих комаров.

Механизм действия фипронила, входящего в состав препарата, заключается в блокировании ГАМК-зависимых рецепторов членистоногих, нарушении передачи нервных импульсов, что приводит к параличу и гибели эктопаразитов.

Бензилбензоат, проникая через хитиновый покров и накапливаясь в организме клещей, оказывает акарицидное действие на личинки и имаго паразитов. Ювемон (метопрен) – аналог природных ювенильных гормонов вызывает аномалии развития насекомых на стадии яйца и личинки, предотвращая появление половозрелых насекомых на животных и в местах их содержания. Диэтилтолуамид обладает репеллентными свойствами, защищая животных от нападения кровососущих двукрылых насекомых.

После топикального нанесения на кожу активные компоненты препарата постепенно распределяются по поверхности тела, накапливаются в жировой смазке кожи, эпидермисе, волосяных луковицах и сальных железах, оказывают длительное контактное действие, обеспечивая защиту животного от эктопаразитов.

БлохНэт® тах по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает кожно-раздражающего и резорбтивно-токсического действия, при попадании в глаза вызывает слабое раздражение. Препарат токсичен для кроликов, а также рыб и других гидробионтов.

## III. Порядок применения

8. БлохНэт® тах назначают собакам и кошкам при энтомозах, вызванных блохами, вшами и власоедами, поражении иксодовыми клещами, а также для предотвращения нападения эктопаразитов на животных.

9. Противопоказанием для применения является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе в анамнезе). Запрещается применение БлохНэт® тах больным инфекционными болезнями и ослабленным животным, собакам массой менее 2 кг, щенкам моложе 10-недельного возраста и котятм моложе 12-недельного возраста.

Не допускается аурикулярное применение препарата (при лечении ушной чесотки) при прободении барабанной перепонки.

Обработку беременных и кормящих самок при необходимости проводят после консультации с ветеринарным врачом.

10. БлохНэт® тах применяют однократно путем топикального (spot-on) нанесения на сухую неповрежденную кожу в места, недоступные для слизывания

животными: собакам – в несколько точек в области спины между лопатками и в области шеи у основания черепа; кошкам – в области шеи у основания черепа в дозах, указанных в таблице.

Таблица

Вид животного, масса	Доза препарата
Собаки	
2 кг – 5 кг	0,5 мл (15 капель)
5 кг – 10 кг	1 мл
10 кг – 20 кг	2 мл
20 кг – 30 кг	3 мл
30 кг – 40 кг	5 мл
Кошки	
до 5 кг	0,5 мл (15 капель)
более 5 кг	1 мл

При обработке собак массой более 40 кг на каждые последующие 10 кг дополнительно наносят по 1 мл препарата.

Повторные обработки животных проводят по показаниям, но не чаще одного раза в 3 недели.

Не следует мыть и купать животное в природных водоемах в течение 48 часов после обработки, а также наносить препарат на влажную или поврежденную кожу.

Для уничтожения присосавшихся к телу животного иксодовых клещей препарат в количестве 1 капли наносят на клеща и место его прикрепления к коже. Если в течение 20 минут клещ самопроизвольно не отпадает, его аккуратно вытаскивают из кожи пинцетом и уничтожают.

Гибель блох, вшей, власоедов наблюдается в течение суток после обработки животного; защитное действие лекарственного препарата после однократной обработки животного против блох сохраняется до 2 месяцев, против иксодовых и саркоптоидных клещей, вшей и власоедов – до 1,5 месяцев, от кровососущих комаров – до 7 дней.

Повторные обработки животных проводят по показаниям, но не чаще одного раза в месяц.

В целях предотвращения повторной инвазии блохами животным заменяют подстилки или обрабатывают их препаратом БлохНэт® спрей в соответствии с инструкцией по его применению.

Для лечения отодектоза (ушной формы чесотки) БлохНэт® тах закапывают в каждое ухо по 4-6 капель. Для равномерного распределения препарата ушную раковину складывают пополам и слегка массируют ее основание. Обработку проводят два раза с интервалом 5-7 дней. БлохНэт® тах обязательно вводят в оба уха, даже в случаях поражения отодектозом только одного уха.

При осложнении отодектоза отитом назначают противомикробные и противовоспалительные средства.

11. При передозировке у животного может наблюдаться избыточное слюноотделение, мышечная дрожь, рвота. В этом случае препарат смывают водой с моющим средством и животному назначают средства симптоматической терапии.

12. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

13. Следует избегать нарушений схемы применения препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска очередной обработки ее возобновляют в той же дозировке и по той же схеме.

14. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности и появлении аллергических реакций, препарат следует смыть водой с моющим средством и назначить животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

15. БлохНэт® тах не следует применять совместно с другими инсекто-акарицидными средствами для обработки животных.

16. БлохНэт® тах не предназначен для обработки продуктивных животных.

#### IV. Меры личной профилактики

17. При обработке животных БлохНэт® тах следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные для работы с лекарственными препаратами. Во время применения лекарственного препарата не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании применения следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.

18. В течение 48 часов после обработки животное не следует гладить и подпускать к маленьким детям.

Людам с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с БлохНэт® тах. При случайном попадании препарата на кожу его необходимо немедленно смыть водой с мылом; при попадании в глаза – промыть их в течение нескольких минут проточной водой. В случае появления аллергических реакций и/или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

19. Запрещается использовать пустые флаконы из-под лекарственного препарата для бытовых целей. Их помещают в полиэтиленовый пакет и утилизируют с бытовыми отходами.

20. Организация–производитель ООО «НВП «Астрафарм»; 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 3. Адрес места производства: 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 3.